




နွားရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း

ဘာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးသလဲ ။


နွားများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းသည် ၊ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ၊ ဥပမာ-ဒေင့်သန်း ၊ လည်ချောင်းကွဲ ၊ ပေါင်ပုတ်လက်ပုတ်စသည့် ရောဂါများကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည် ။ အဆိုပါ ရောဂါများဖြစ်ပွားပါက

- နွားများအသေအပျောက်မြန်ခြင်း ၊ အသေများခြင်း ။
- အသက်မသေပါက အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း ။
- အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ၊ ကြီးထွားမှုနှေးကွေးခြင်း ။
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည် ။

အချို့တောင်သူများသည် အချိန်ကုန်မခံလိုခြင်း ၊ ငွေကုန်မခံလိုခြင်းကြောင့် မိမိနွားများကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးကြပါ ။ သို့ရာတွင် ကာကွယ်ဆေး၏အကျိုးသည် ဆေးဘိုးထက်များစွာသာသည်ကို သတိပြုသင့်သည် ။



လိုအပ်ချက်များ။



- ကာကွယ်ဆေး
(မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှရရှိနိုင်သည်)
- နွားထိန်းချုပ်ညှပ် ၊ ညှပ်မရှိပါက ၊
လည်ပင်းကြိုးကိုတိုင်တွင်ပတ်၍ ချိန်ခိုင်ရန် ခိုင်ခန့်သောတိုင်တလုံး
- သို့မဟုတ် ယာယီညှပ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဝါးလုံး(၂)လုံး ။

ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း။

ကျေးရွာအတွင်း သင့်လျော်သောနေရာတစ်ခုခုတွင် နွားချည်တိုင် (သို့မဟုတ်) ဝါးလုံးနှစ်လုံးဖြင့်ညှပ်ပြုလုပ်ပါ ။

အဆိုပါလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတောင်သူအဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာကော်မတီအကူအညီဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည် ။

- ၁။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမည့်နေ့ရက် ၊ နေရာ ၊ အချိန်ကိုတိစွာစာရွက်စာတမ်းနှင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည် ။
- ၂။ လယ်သမားများအားလုံး မိမိတို့သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ နေ့ရက် ၊ အချိန်မီ မိမိတို့နွားများနှင့်အတူ စုဝေးရောက်ရှိရန်
- ၃။ လိုပါသည် ။ သို့မှသာတစ်ချိန်တည်းဆေးထိုးပေးနိုင်ပါမည် ။
- ၄။ ဆေးထိုးမည့်ရက်တွင်ကာကွယ်ဆေးကို တိစွာစာရွက်စာတမ်းကယူလာ၍ ထိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
- ၅။ ညှပ်မရှိပါကလည်း ပိုင်ရှင်မှနဖူးကြိုးကိုကိုင်ပြီး ထိန်းပေးပါက ဆေးထိုးနိုင်ပါသည် ။
- ၆။ မိမိပြုကွဲဒိန်ပေါ်တွင် နွားများ၏ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်ရက်နှင့် ဆေးအမည်ကိုမှတ်သားထားရပါမည် ။
- ၇။ နွားဒေါင့်သန်းရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပါက ဆေးထိုးပြီးလျှင်ဖျားတတ်ပါသဖြင့် ဆေးထိုးပြီးတိုင်း (၁-၂) ရက်ခန့်
- ၈။ အနားပေးရန်လိုပါသည် ။ အခြားရောဂါကာကွယ်ဆေးများအတွက် အထူးသတိပြုရန်မလိုပါ ။
- ၉။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနွားများကို (၆) လတစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အောက်ဖော်ပြပါဇယား
- ၁၀။ အတိုင်း ဆေးအမျိုးအစားအလိုက် ထပ်မံဆေးထိုးပေးရန်လိုပါသည် ။

ဘယ်အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အကောင်းဆုံးလဲ

ရာသီအပြောင်းအလဲတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားတတ်ရာ ၊ မိမိ၏နွားများကို မိုးဦးနှင့်မိုးနှောင်းကာလများတွင်ဖြစ်စေ ၊

အနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားနေလျှင်ဖြစ်စေ ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် ။

တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ဆေးတစ်မျိုးထက်ပိုပြီးထိုးရန်မသင့်ပါ ။ အနည်းဆုံး (၇) ရက်ခန့်ခြားပြီးမှ အခြားဆေးတစ်မျိုး ထိုးသင့်ပါသည် ။

ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအခြေပြဇယား။

စဉ်	ရောဂါကာကွယ်ဆေးအမည်	ထပ်မံဆေးထိုးမည့်ကာလ
၁	နွားပေါင်ပုတ် ၊ လက်ပုတ်	၆-လတစ်ကြိမ်
၂	နွားဒေါင့်သန်း	တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
၃	နွား ခွါနာ ၊ လျှာနာ	၆-လတစ်ကြိမ်
၄	နွားလည်ချောင်းကွဲ (ဂျိတ်နာ)	၆-လတစ်ကြိမ်